

faites aucun commentaire. Si le repas n'est pas touché, on le représente le soir s'il n'est mangé qu'à moitié, il faut donner le reste le soir sans remettre une dose. Décontenancé par votre attitude, il se rendra compte qu'il ne peut pas vous faire tourner en bourrique sur ce plan là (il en trouvera peut être un autre !). Vous verrez votre compagnon manger de nouveau au bout de 3 ou 4 jours mais ne criez pas victoire, ne lui montrez sous aucun prétexte votre contentement ; le fait de manger doit être considéré comme un acte normal qui n'entraînent pas systématiquement réprimandes ou cris de joie.



J'ai droit à un fond de gamelle... encore faut-il le trouver !

3 → Quantités de nourriture à donner

→ a) en période de croissance

Ce tableau est préconisé pour la marque de croquettes utilisée chez moi, les quantités peuvent différer suivant les fabricants.

	2-4 mois (en 3 ou 4 repas)	5 - 7 mois (en 2 ou 3 repas)	8 - 12 mois (en 2 repas)
5 kg	210 grammes		
7,5 kg	270		
10 kg	340		
12,5 kg	400		
15 kg	400		
17,5 kg	450	480	
20 kg	450	520	
22,5 kg	500	550	
25 kg	500	600	
30 kg	550	650	
35 kg		650	600
40 kg		700	600
45 kg		700	650
50 kg			720
55 kg			730

Attention au poids moyen que devrait faire votre chiot. En cas de dépassement, donnez les rations pour un poids inférieur.

La meilleure méthode consiste à peser son Bibounet toutes les semaines, aussi longtemps que la balance le supporte, la prise de poids hebdomadaire doit être de 1,2 à 1,7 kg (idéalement 1,5 kilo). En fonction de la prise de poids, vous pouvez ainsi adapter la ration journalière. C'est la meilleure façon de ne pas céder à la tentation de rajouter des croquettes, car le chiot Bernois a une mémoire sélective et oublie très vite qu'il vient de manger, vous réclamant toujours plus. Alors on lui apprend à lire les chiffres sur la balance et hop le tour est joué !

Il faut toujours s'adapter en fonction de son compagnon. Certains chiots très vifs et joueurs n'auront pas le temps de faire de la graisse et auront besoin de plus de calories qu'un pantouflard.

En règle générale, la transition entre croquettes "chiots" et "junior" doit se faire vers 4 ou 5 mois. Les croquettes "adulte" peuvent être servies dès la puberté.